

# Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – будущее науки»

## Математика, финальный тур, 2025-2026 уч.г.

*Время выполнения 180 минут*

Каждая из пяти задач данной олимпиады оценивается, исходя из максимума в 20 баллов. Таким образом, максимальный результат участника может быть 100 баллов.

### 7 класс

- 7.1. К числу 2026 припишите по одной цифре слева и справа, чтобы полученное шестизначное число делилось на 936. Укажите все возможные решения.

**Ответ:** 420264. **Решение.** Разложим 936 на простые множители:  $936 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 13$ . Чтобы число делилось на 936 необходимо и достаточно, чтобы оно делилось на 8, на 9 и на 13. По признаку делимости на 8 трехзначное число, образованное тремя последними цифрами, должно делиться на 8. Следовательно, справа к 2026 можно приписать только четную цифру. Из чисел 260, 262, 264, 266, 268 на 8 делится только 264, поэтому справа можно приписать только цифру 4. Получаем число вида \*20264. По признаку делимости на 9 сумма цифр числа должна делиться на 9. Найдем сумму  $2 + 0 + 2 + 6 + 4 = 14$ . Чтобы сумма цифр числа \*20264 делилась на 9, слева можно приписать только цифру 4, т.к. все остальные цифры в сумме с числом 14 не дают числа, кратного 9. Получаем число 420264. Осталось проверить, что оно делится на 13.

- 7.2. Аня и Боря вышли в 12-00 из пунктов  $A$  и  $B$  соответственно навстречу друг другу. Они шли с постоянными скоростями, причем скорость Бори на 10% больше скорости Ани. Они поравнялись друг с другом в 12-40 и продолжали своё движение. Во сколько Аня придет в пункт  $B$ ?

**Ответ:** 13-24. **Решение.** Пусть расстояние между пунктами  $A$  и  $B$  равно  $S$  м, скорость Ани равна  $v$  м/мин, тогда скорость Бори равна  $1,1v$  м/мин, а скорость сближения Ани и Бори равна  $v + 1,1v = 2,1v$  (м/мин). По условию задачи  $\frac{S}{2,1v} = 40$ , откуда  $\frac{S}{v} = 2,1 \cdot 40 = 84$  (мин), т.е. Ане на путь от  $A$  до  $B$  требуется 84 мин, а поэтому в пункт  $B$  Аня придет в 13-24.

- 7.3. Дан прямоугольник, отличный от квадрата. Известно, что его площадь численно равна утроенному периметру. Докажите, что у этого прямоугольника меньшая сторона меньше 12, а большая – больше 12.


**Решение.** Пусть меньшая сторона прямоугольника равна  $x$ , а большая –  $y$ . Тогда утроенный периметр прямоугольника равен  $3(2x + 2y) = 6x + 6y$ , а площадь равна  $xy$ . По условию задачи  $xy = 6x + 6y$ . Запишем это равенство в виде  $(x - 6)(y - 6) = 36$ . В левой части последнего равенства оба множителя положительны, т.к. в противном случае произведение  $(6 - x)(6 - y)$  будет меньше 36. Тогда меньший множитель  $(x - 6)$  меньше 6, а больший  $(y - 6)$  – больше 6. Отсюда следует результат.

- 7.4. а) Дано простое число, которое представлено в виде суммы квадратов четырех различных простых чисел. Может ли в этом представлении присутствовать  $3^2$ ? б) Найдите наименьшее простое число, представимое в виде суммы квадратов четырех различных простых чисел.

**Ответ:** а) не может; б)  $199 = 2^2 + 5^2 + 7^2 + 11^2$ . **Решение.** Пусть  $p = p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + p_4^2$ , где  $p_1, p_2, p_3, p_4$  – различные простые числа, взятые в порядке возрастания. Тогда  $p_1 = 2$ , т.к. иначе число  $p$  как сумма четырех нечетных чисел было бы четным (и больше 2). а) Если  $p_2 = 3$ , то каждое из чисел  $p_1^2, p_3^2$  и  $p_4^2$  при делении на 3 даёт остаток 1 (т.к. квадраты чисел, не кратных трём, дают остаток 1 при делении на 3). Но тогда  $p > 3$  и делится на 3, т.е.  $p$  не является простым числом, что противоречит условию. Значит, в указанном представлении числа  $p$  не может присутствовать  $3^2$ . б) В силу пункта а) в указанном представлении нет  $3^2$ , и поэтому наименьший «кандидат» для проверки  $2^2 + 5^2 + 7^2 + 11^2 = 199$ , и действительно, число 199 является простым. **Комментарий.** Пункт б) можно решить и без пункта а) с помощью небольшого перебора (но при обосновании простоты и минимальности данного примера).

- 7.5. В классе 30 человек. Может ли оказаться так, что а) у каждого ученика ровно три друга в классе? б) у любых двух учеников разное число друзей в классе?

**Ответ:** а) может; б) не может. **Решение.** а) См. схему (граф), на которой отрезки соединяют пары друзей.



б) Если предположить, от противного, что у всех разное количество друзей, то (поскольку 30 друзей быть не может), эти количества представляют собой все целые числа от 0 до 29. Но если у кого-то 0 друзей (т.е друзей нет), то не может быть ученика, у которого все 29 друзей. Противоречие.

## 8 класс

- 8.1. Аня и Боря вышли в 12-00 из пунктов  $A$  и  $B$  соответственно навстречу друг другу. Они шли с постоянными скоростями, причем скорость Бори на 10% больше скорости Ани. Они поравнялись друг с другом в 12-40 и продолжали своё движение. Во сколько Аня придет в пункт  $B$ ?

**Ответ:** 13-24. **Решение.** См. задачу 7.2.

- 8.2. В треугольнике  $ABC$ , у которого угол  $A$  вдвое больше угла  $C$ , проведена биссектриса  $AM$ . Можно ли утверждать, что угол  $A$  острый, если известно, что  $CM > BM$ ?

**Ответ:** можно. **Решение.** Так как  $\angle A = 2\angle C$  и  $AM$  – биссектриса  $\angle BAC$ , то  $\angle BAM = \angle MAC = 0,5\angle A = \angle C$ . Значит, треугольник  $AMC$  равнобедренный и  $AM = MC$ . Таким образом, из условия задачи следует, что  $AM > BM$ , и поэтому в треугольнике  $ABM$  имеем:  $\angle B > \angle BAM = \angle C$ . Поскольку  $\angle B = 180^\circ - \angle A - \angle C$ , получаем неравенство  $180^\circ - 3\angle C > \angle C$ , откуда  $4\angle C < 180^\circ$  и значит,  $\angle C < 45^\circ$ . Таким образом,  $\angle A = 2\angle C < 90^\circ$ .

**Комментарий.** Свойство биссектрисы  $CM : BM = CA : BA$  также позволяет сделать вывод о том, что  $\angle B > \angle C$  в треугольнике  $ABC$ , т.к.  $CA > BA$ .

- 8.3. На доске записано несколько целых чисел. Саша заменил каждое число (стерев его) следующим образом: каждое число, делящееся на 3, он сократил в три раза, а остальные числа заменил на утроенные. Могло ли оказаться так, что сумма новых и сумма исходных чисел совпали, если сумма исходных чисел была равна а) 2026; б) 100?

**Ответ:** а) не могло; б) могло. **Решение.** Обозначим через  $A$  начальную сумму чисел, делящихся на 3,  $B$  – сумму остальных чисел. Тогда должно выполняться равенство  $\frac{A}{3} + 3B = A + B \Leftrightarrow A = 3B$ . Значит, сумма на доске должна быть равна  $A + B = 4B$ . а) Если  $A + B = 2026$ , то это приводит к противоречию с делимостью на 4. б) Если  $A + B = 100$ , то легко проверить такой пример: пусть на доске были записаны два числа 75 и 25.

- 8.4. Дано простое число  $p$ , которое представлено в виде суммы квадратов четырех простых чисел  $p_1, p_2, p_3, p_4$ , где  $p_1 < p_2 < p_3 < p_4$ . Докажите, что  $p_2 - p_1 > 2$ .

**Решение.** В решении задачи 7.4 доказано, что  $p_1 = 2$  и  $p_2 > 3$ . Отсюда следует результат.

- 8.5. Имеется 100 палочек, длина каждой из них больше единицы, но меньше  $(1,5)^{100}$ . Докажите, что найдутся три палочки, из которых можно сложить треугольник.

**Решение.** Рассуждая от противного, предположим, что никакие три палочки не составляют треугольник. Расположим данные палочки в порядке возрастания длины. Тогда их длины  $a_n$  представляют монотонно возрастающую (возможно, нестрого) последовательность, которая (в силу предположения) удовлетворяет неравенствам  $a_{n+2} \geq a_n + a_{n+1}$  при всех  $n = 1, 2, \dots, 98$ . Тогда  $a_3 > 1 + 1 = 2$ ,  $a_4 > 2 + 1 = 3$ ,  $a_5 > 3 + 2 = 5$ , и аналогично, получаем  $a_6 > 8$ ,  $a_7 > 13$ ,  $a_8 > 21$ ,  $a_9 > 34$ ,  $a_{10} > 55$ ,  $a_{11} > 89 > (1,5)^{11}$ , т.к.  $(1,5)^{11} < 87$ ,  $a_{12} > 144 > (1,5)^{12}$ , т.к.  $(1,5)^{12} < 130$ . Докажем теперь по индукции, что  $a_n > (1,5)^n$  при всех  $n > 10$ . База индукции проверена последними оценками выше. Шаг индукции получается так:  $a_{n+2} \geq a_n + a_{n+1} > (1,5)^n + (1,5)^{n+1} = (1,5)^n \cdot (1 + 1,5) > (1,5)^n \cdot (1,5)^2 = (1,5)^{n+2}$ . Итак, индукционное утверждение доказано, и при  $n = 100$  приходим к противоречию с условием задачи на максимальную длину палочек. **Комментарий.** 1) Члены последовательности  $a_n$  оцениваются снизу последовательностью Фибоначчи, и для тех, кто знает формулу общего члена ряда Фибоначчи, можно было бы ею воспользоваться, предварительно доказав её. Но и после этого потребовалось бы

доказывать оценку  $a_n > (1,5)^n$ . 2) Сравнения чисел 87 и 144 с соответствующими степенями 1,5 легко получаются без калькулятора, на листочке.

## 9 класс

- 9.1. Дано сто чисел: 1,  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{3}$ , ...,  $\sqrt{100}$ . Вычислим 98 разностей (через одно число):  $a_1 = \sqrt{3} - 1$ ,  $a_2 = \sqrt{4} - \sqrt{2}$ , ...,  $a_{98} = \sqrt{100} - \sqrt{98}$ . Докажите, что  $17,5 < a_1 + a_2 + \dots + a_{98} < 17,6$ .

**Решение.**  $a_1 + a_2 + \dots + a_{98} = \sqrt{3} - 1 + \sqrt{4} - \sqrt{2} + \sqrt{5} - \sqrt{3} + \dots + \sqrt{98} - \sqrt{96} + \sqrt{99} - \sqrt{97} + \sqrt{100} - \sqrt{98} =$   
 $= \sqrt{100} + \sqrt{99} - \sqrt{2} - 1 = 9 + \sqrt{99} - \sqrt{2}$ . В силу того, что  $9,94^2 = 98,8036 < 99 < 99,0025 = 9,95^2$  и  $1,41^2 = 1,9881 < 2 < 2,0164 = 1,42^2$ , получаем следующие оценки  $17,52 = 9 + 9,94 - 1,42 < 9 + \sqrt{99} - \sqrt{2} < 9 + 9,95 - 1,41 = 17,54$ . Значит,  $17,5 < a_1 + a_2 + \dots + a_{98} < 17,6$ .

**Комментарий.** Здесь для получения оценки сверху достаточно неравенств  $\sqrt{99} < 10$  и  $\sqrt{2} > 1,4$ , т.е. с точностью до десятых, а для оценки снизу надо оценивать квадратные корни с точностью до сотых:  $\sqrt{99} > 9,94$  и  $\sqrt{2} < 1,42$ . Использование вместо строгих неравенств приближенных равенств  $\approx$  для корней без уточнения погрешностей при оценке результата считается грубой ошибкой.

- 9.2. На доске записано несколько целых чисел. Саша заменил каждое число (стерев его) следующим образом: каждое число, делящееся на 3, он сократил в три раза, а остальные числа заменил на утроенные. Могло ли оказаться так, что сумма новых и сумма исходных чисел совпали, если сумма исходных чисел была равна **а) 2026; б) 100?**


**Ответ:** **а)** не могло; **б)** могло. **Решение.** См. задачу 8.3.

- 9.3. Сколько существует шестизначных натуральных чисел, составленных из нечетных цифр, среди которых **а)** ровно одна семёрка и одна девятка? **б)** есть и семёрка и девятка?

**Ответ:** **а)** 2430. **б)** 8162. **Решение.** **а)** Количество шестизначных чисел, составленных из нечетных цифр и содержащих ровно одну семерку и одну девятку определяется (по правилу произведения) как произведение числа способов выбора мест для семерки и девятки на число способов заполнения остальных мест любыми нечетными цифрами, кроме семерки и девятки. Место для семерки можно выбрать 6 способами, после чего место для девятки – 5 способами. Остальные 4 места в шестизначном числе заполняются любыми из оставшихся трёх цифр (1, 3 или 5). Таким образом, получаем  $6 \cdot 5 \cdot 3^4 = 2430$ . **б)** Для того, чтобы найти количество шестизначных чисел, составленных из нечетных цифр, среди которых есть и семёрка, и девятка, рассмотрим дополнительное множество, т.е. найдем количество шестизначных чисел, составленных из нечетных цифр и не содержащих хотя бы одну из цифр 7 или 9. Количество шестизначных чисел, составленных из нечетных цифр и не содержащих семерку, равно  $4^6$ , и аналогично, количество шестизначных чисел из нечетных цифр, не содержащих девятку, равно  $4^6$ . Если сложить эти количества, то при этом дважды будут учтены числа, составленные из нечетных цифр и не содержащие ни семерку, ни девятку, а таких чисел  $3^6$ . Таким образом, количество шестизначных чисел, составленных из нечетных цифр и не содержащих хотя бы одну из цифр 7 или 9, равно  $2 \cdot 4^6 - 3^6$ . Общее количество шестизначных чисел, составленных из нечетных цифр, равно  $5^6$ . Поэтому искомое количество равно  $5^6 - 2 \cdot 4^6 + 3^6 = 8162$ .

- 9.4. Дан треугольник  $ABC$  периметра  $P$  с острыми углами  $A$  и  $C$ . Для текущей точки  $M$  на стороне  $AC$  рассматриваются точки  $M_1$  и  $M_2$  – центры окружностей, описанных около треугольников  $ABM$  и  $CBM$ . Чему равно наименьшее значение периметра треугольника  $M_1MM_2$ ?

**Ответ:**  $P/2$ . **Решение.** Докажем сначала подобие треугольников  $M_1MM_2$  и  $ABC$ . Пусть  $K$  – середина отрезка  $BM$ . Тогда точки  $M_1$ ,  $K$  и  $M_2$  лежат на одной прямой, перпендикулярной отрезку  $BM$ . По свойству вписанного угла  $A$  для описанной около треугольника  $ABM$  окружности с центром в  $M_1$  имеем:  $\angle BM_1M = 2\angle A$ , а в силу того, что треугольник  $BM_1M$  с основанием  $BM$  равнобедренный, получаем:  $\angle KM_1M = \angle A$ . Аналогично,  $\angle KM_2M = \angle C$ . Значит, треугольники  $M_1MM_2$  и  $ABC$  подобны, а в подобных



отношении сторон  $M_1M/MA = M_2M/CA$ . Тогда  $M_1M/M_2M = MA/CA$ . Аналогично,  $M_1M/M_2M = MB/BC$ . Следовательно,  $M_1M/M_2M = MA/CA = MB/BC$ . Поэтому  $M_1M/M_2M = 1$ , т.е.  $M_1M = M_2M$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и  $\angle M_2MM_1 = \angle M_1M_2M$ , то  $\angle M_1M_2M = \angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1$ . Поэтому  $\angle M_1M_2M = 60^\circ$ . Тогда  $\angle M_1MM_2 = \angle M_2MM_1 = 30^\circ$ . А так как  $\angle M_1MM_2 = \angle M_1M_2M$  и <math

треугольниках коэффициент подобия равен отношению соответствующих высот. Высота в треугольнике  $M_1MM_2$  из вершины  $M$  равна  $MK = BM/2$ , а высота в треугольнике  $ABC$  из вершины  $B$  не зависит от точки  $M$ . Так как углы  $A$  и  $C$  острые, то основание этой высоты лежит на стороне  $AC$ , и коэффициент подобия будет минимальным, когда наклонная  $BM$  совпадет с этой высотой. Таким образом, минимальное значение коэффициента подобия равно 0,5 и соответствует минимальному значению периметра треугольника  $M_1MM_2$ , равного  $P/2$ .

- 9.5.** Докажите, что число  $N = 2^{2026} + 1$  имеет не менее **а)** двух различных простых делителей; **б)** трех различных простых делителей.

**Решение.** **а)**  $N$  делится на 5, что следует из проверки последней цифры, равной 5, т.к. последние цифры степеней любого числа, в данном случае – двойки, повторяются с периодом 4 (другой способ проверки заключается в рассмотрении сравнения по модулю 5). Таким образом,  $N = 5 \cdot ((2^{2026} + 1)/5)$ . Осталось проверить, что  $(2^{2026} + 1)$  не делится на 25 (и тогда любой простой делитель  $N/5$  будет искомым). Поскольку  $2^{10} = 1024$  имеет вид  $25k - 1$ , то  $2^{2020} = (2^{10})^{202}$  будет иметь вид  $25k + 1$  (даёт остаток 1 при делении на 25, т.к. степень 202 четная), и поэтому  $2^{2026} = 2^{2020} \cdot 2^6 = 2^{2020} \cdot 64$  имеет вид  $25k + 14$ , а  $N$  имеет вид  $25k + 15$ . **б)** Дополним  $N$  до полного квадрата:  $N = 2^{2026} + 1 = 2^{2026} + 2 \cdot 2^{1013} + 1 - 2^{1014} = (2^{1013} + 1)^2 - (2^{507})^2 = (2^{1013} + 1 - 2^{507})(2^{1013} + 1 + 2^{507})$ . Обозначим через  $A$  и  $B$  первый и второй сомножитель, соответственно. Эти сомножители взаимно просты, т.к. их разность равна  $2^{508}$ , а сами сомножители нечетные. Первый сомножитель  $A$  делится на 5: действительно, при делении на 5 число  $2^{1013}$  даёт остаток 2, а  $2^{507}$  даёт остаток 3 (см. пункт а). Число  $B$  не делится на 5, т.к. отличается от  $A$  на степень двойки. Поэтому имеем разложение  $N = 5 \cdot \frac{A}{5} \cdot B$  на три множителя, и для того, чтобы показать, что эти три множителя делятся на разные простые числа, достаточно проверить, что  $A$  не делится на 25. Но это следует из пункта а), т.к. мы показали, что  $N$  не делится на 25.

## 10 класс

- 10.1.** Дано сто чисел:  $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots, \sqrt{100}$ . Вычислим 98 разностей (через одно число):  $a_1 = \sqrt{3} - 1$ ,  $a_2 = \sqrt{4} - \sqrt{2}, \dots, a_{98} = \sqrt{100} - \sqrt{98}$ . Докажите, что  $17,5 < a_1 + a_2 + \dots + a_{98} < 17,6$ .

**Решение.** См. задачу 9.1.

- 10.2.** Существуют ли рациональные, но не целые, числа  $x, y$ , для которых **а)** числа  $2x^2 + y^2$  и  $x^2 - 4y^2$  ненулевые целые; **б)** числа  $2x^2 + y^2$  и  $3x^2 - 4y^2$  целые?

**Ответ:** **а)** существуют; **б)** не существуют. **Решение.** **а)** пусть  $2x^2 + y^2 = m$ ,  $x^2 - 4y^2 = n$ , где  $m, n$  – ненулевые целые числа. Решая эту систему, найдем  $9x^2 = 4m + n$ ;  $9y^2 = m - 2n$ . Поэтому  $x = x_1/3, y = y_1/3$ , где  $x_1, y_1$  – целые числа, не кратные трём. Тогда оба числа  $2x_1^2 + y_1^2$  и  $x_1^2 - 4y_1^2$  должны делиться на 9 (и не равняться 0). Положив, например,  $x_1 = 7, y_1 = 1$ , получим  $x = 7/3, y = 1/3$ ; здесь  $x_1, y_1$  выбраны с учетом возможных остатков квадратов чисел при делении на 9, а именно, ненулевые остатки могут быть только 1, 4 и 7. (Если взять  $x_1 = 1, y_1 = 4$ , получим другой пример  $x = 1/3, y = 4/3$ , и т.п.) **б)** Решая вторую систему, получим, аналогично, что  $11x^2$  – число целое. Если предположить противное, то  $x = p/q$ , где  $p$  и  $q$  – взаимно простые целые числа,  $q > 1$ . Но отсюда следует, что 11 делится на  $q^2$ , а это возможно лишь при  $q = 1$ . *Комментарий. Данные соотношения как системы двух уравнений с двумя неизвестными  $x^2$  и  $y^2$  для пунктов а) и б) отличаются тем, что у первой системы определитель равен 9, т.е. точному квадрату, и мы смогли привести пример искомого решения. Для второй системы определитель равен 11, и рациональных, но не целых, решений не существует. Для полного решения пункта а) необходимо приводить рассуждения, подобные выше изложенным: достаточно привести конкретный пример.*

- 10.3. Дан треугольник  $ABC$  площади  $S$  с острыми углами  $A$  и  $C$ . Для текущей точки  $M$  на стороне  $AC$  рассматриваются точки  $M_1$  и  $M_2$  – центры окружностей, описанных около треугольников  $ABM$  и  $CBM$ . Чему равно наименьшее значение площади треугольника  $M_1MM_2$ ?

**Ответ:**  $S/4$ . **Решение.** В силу подобия треугольников  $M_1MM_2$  и  $ABC$  (см. задачу 9.4) наименьшее значение площади треугольника  $M_1MM_2$  будет при наименьшем значении коэффициента подобия, который равен  $1/2$ , когда точка  $M$  является основанием высоты треугольника  $ABC$ , опущенной из вершины  $B$ . Поэтому наименьшее значение площади треугольника  $M_1MM_2$  равно  $(1/2)^2 \cdot S$ .

- 10.4 Круг разбит на 125 секторов, занумерованных по часовой стрелке последовательными числами от 1 до 125 (начиная с некоторого сектора). Вначале в одном из секторов сидит кузнецик. Затем он прыгает, перемещаясь каждый раз по кругу на количество секторов по часовой стрелке, равное номеру текущего сектора. **а)** Докажите, что существует по меньшей мере 25 секторов, в которых кузнецик не сможет побывать. **б)** Какое наибольшее количество секторов он может посетить?

**Ответ: б) 100.** **Решение.** **а)** Пусть вначале кузнецик сидел в секторе под номером  $x$ . Тогда после одного прыжка он будет в секторе  $x + x = 2x$ , после двух прыжков – в секторе  $4x$ , и т.д.: после  $n$  прыжков – в секторе  $2^n \cdot x$ , где все номера секторов берутся по модулю 125. Если  $x$  делится на 5, то все числа  $2^n \cdot x$  делятся на 5 и поэтому остатки  $2^n \cdot x \pmod{125}$  при любых  $n$  будут кратны пяти. Тем самым в этом случае останутся свободными («непосещенными») как минимум 100 секторов с номерами, не кратными пяти. Если же  $x$  не делится на 5, то все числа  $2^n \cdot x$  не кратны пяти, а значит, и остатки  $2^n \cdot x \pmod{125}$  не кратны пяти, и в этом случае свободными останутся как минимум 25 секторов, кратных пяти. **б)** В пункте а) доказана оценка: кузнецик не может посетить более 100 секторов. Осталось привести пример. Пусть вначале кузнецик сидел в секторе с номером 1. Требуется доказать, что остатки  $2^n \pmod{125}$  принимают 100 различных значений при  $n = 0, 1, \dots, 99$ . Сначала проверим, что  $2^{100} \equiv 1 \pmod{125}$ . Имеем:  $2^{10} = 1024 \equiv -1 \pmod{25}$ , отсюда  $2^{20} = (2^{10})^2 \equiv 1 \pmod{25}$ . Поэтому при разложении разности пятых степеней  $(2^{20})^5 - 1 = 2^{100} - 1 = (2^{20} - 1)(2^{80} + 2^{60} + 2^{40} + 2^{20} + 1)$  первый множитель делится на 25, а во втором множителе каждое из пяти слагаемых сравнимо с 1  $\pmod{25}$  и значит, второй множитель делится на 5. Далее докажем, что для натуральных показателей  $m < 100$  остатки  $2^m \pmod{125}$  не равны единице и поэтому эти остатки при  $m < 100$  не повторяются (т.к. из сравнения  $2^{m_1} \equiv 2^{m_2} \pmod{125}$ , где  $m_1 < m_2$ , следовало бы, что  $2^{m_2 - m_1} \equiv 1 \pmod{125}$ ). Действительно, если для некоторого наименьшего натурального  $m < 100$  остаток  $2^m \equiv 1 \pmod{125}$ , то в силу сравнения  $2^{100} \equiv 1 \pmod{125}$ , показатель  $m$  должен быть делителем  $100 = 2^2 \cdot 5^2$ , а значит, делителем либо  $50 = 2 \cdot 5^2$ , либо  $20 = 2^2 \cdot 5$ . Но в первом случае  $2^{50} - 1$  не делится даже на 5, а во втором – имеем  $2^{20} - 1 = (2^{10} - 1)(2^{10} + 1)$ , где первый множитель не делится на 5, а второй равен 1025, т.е. не делится на 125. **Комментарий.** Сравнение  $2^{100} \equiv 1 \pmod{125}$  следует из теоремы Эйлера (обобщение малой теоремы Ферма). При её использовании доказательство не требуется, нужно лишь сформулировать и проверить её условия в данном случае.

- 10.5. Последовательность  $a_n$  задается рекуррентно:  $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$ ,  $a_1 = 1$ ,  $a_2 = \frac{10}{9}$ . Какова вероятность, что случайно выбранный член последовательности является целым числом?

**Ответ:** 1/6. **Решение.** Выражение для  $a_{n+2}$  перепишем в виде  $a_{n+2} - a_{n+1} = 2(a_{n+1} - a_n)$ . Поэтому для  $n \geq 1$  будем иметь  $a_{n+2} - a_{n+1} = 2(a_{n+1} - a_n) = 4(a_n - a_{n-1}) = \dots = 2^n(a_2 - a_1) = \frac{1}{9} \cdot 2^n$ . Тогда  $a_{n+2} = a_1 + (a_2 - a_1) + \dots + (a_{n+2} - a_{n+1}) = 1 + \frac{1}{9}(1 + 2 + \dots + 2^n) = 1 + \frac{1}{9}(2^{n+1} - 1)$ . Поскольку  $2^6 \equiv 1 \pmod{9}$ , то  $2^{6k} \equiv 1 \pmod{9}$  при всех натуральных  $k$ , и степени двойки дают остатки  $\pmod{9}$  с периодом 6, а именно: 2, 4, 8, 7, 5, 1. Итак, члены подпоследовательности  $a_1, a_7, a_{13}, a_{19}, \dots$  (каждый шестой), и только они, будут целыми числами и поэтому искомая статистическая вероятность равна 1/6. **Комментарий.** Те,

кто знает метод решения линейных рекуррентных уравнений, могут применить его для нахождения формулы общего члена  $a_n$  вместо вышеприведенного приема.

## 11 класс

**11.1.** При каких значениях параметра  $a$  уравнение  $5 + \cos 2x = 4a + 4a \sin x$  имеет решение?

**Ответ:**  $a \geq 0,5$ . **Решение.** Введем замену  $t = \sin x$ , где  $|t| \leq 1$ . Применяя формулу косинуса двойного угла, получим уравнение  $t^2 + 2at + 2a - 3 = 0$ . Требуется найти все  $a$ , для которых это уравнение имеет хотя бы один корень на отрезке  $[-1; 1]$ . Пусть  $f(t) = t^2 + 2at + 2a - 3$  – квадратный трехчлен (парабола) в левой части уравнения. Ветви параболы направлены вверх, а значение  $f(-1) = 1 - 2a + 2a - 3 = -2 < 0$  (при всех  $a$ ). Поэтому один из корней  $f(t)$  меньше  $-1$ , а условие существования другого корня на отрезке  $[-1; 1]$  равносильно неравенству  $f(1) \geq 0$ . Таким образом,  $f(1) = 1 + 2a + 2a - 3 = 4a - 2 \geq 0$ , т.е.  $a \geq 0,5$ .

**11.2.** Дан тетраэдр  $SABC$ . Требуется пересечь его плоскостью, параллельной основанию  $ABC$ , и выбрать точку  $M$  в плоскости основания так, чтобы объем тетраэдра  $MA_1B_1C_1$  был наибольшим, где  $A_1, B_1, C_1$  – точки пересечения плоскости сечения с боковыми ребрами тетраэдра  $SABC$ . Найдите отношение объема искомого тетраэдра  $MA_1B_1C_1$  к объему тетраэдра  $SABC$ .

**Ответ:**  $4/27$ . **Решение.** Так как плоскости  $ABC$  и  $A_1B_1C_1$  параллельны, то объем тетраэдра  $MA_1B_1C_1$  не зависит от положения точки  $M$  в плоскости  $ABC$ . Обозначим через  $x$  коэффициент подобия тетраэдров  $SA_1B_1C_1$  и  $SABC$ . Тогда площади оснований тетраэдров  $MA_1B_1C_1$  и  $ABC$  относятся как  $x^2$ , а высоты – как  $(1-x)$  (т.к. высоты тетраэдров  $SA_1B_1C_1$  и  $SABC$  относятся как  $x$ , а высота тетраэдра  $MA_1B_1C_1$  равна разности высот тетраэдра  $SABC$  и тетраэдра  $SA_1B_1C_1$ ). Обозначив отношение объемов данных тетраэдров через  $y = y(x)$ ,  $0 < x < 1$ , получаем задачу на максимум функции  $y = x^2(1-x)$ . Решая её с помощью производной  $y' = 2x - 3x^2$ , находим критическую точку  $x_0 = \frac{2}{3}$ , в которой знак производной меняется с плюса на минус, и значит, достигается максимум  $y(x_0) = 4/27$ , а на границе ОДЗ  $y(0)=y(1)=0$ .

**11.3.** Круг разбит на 125 секторов, занумерованных по часовой стрелке последовательными числами от 1 до 125 (начиная с некоторого сектора). Вначале в одном из секторов сидит кузнецик. Затем он прыгает, перемещаясь каждый раз по кругу на количество секторов по часовой стрелке, равное номеру текущего сектора. **а)** Докажите, что существует по меньшей мере 25 секторов, в которых кузнецик не сможет побывать. **б)** Какое наибольшее количество секторов он может посетить?

**Ответ:** **б)** 100. **Решение.** См. задачу 10.4.

**11.4.** Последовательность  $a_n$  задается рекуррентно:  $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$ ,  $a_1 = 1$ ,  $a_2 = \frac{10}{9}$ . Какова вероятность, что случайно выбранный член последовательности является целым числом?

**Ответ:** **1/6.** **Решение.** См. задачу 10.5.

**11.5.** Учитель написал на доске 9 различных положительных чисел и дал задание 6 ученикам вычислить и записать в тетради: Ане – набор произведений всевозможных пар чисел на доске, Боре – набор произведений всевозможных троек, и т.д., Егору – набор произведений всевозможных «семёрок». Могло ли в результате оказаться так, что для каждого из учеников есть другой ученик, у которого записан точно такой же набор? (Равные числа в наборе повторяются столько раз, сколько получается одинаковых произведений).

**Ответ:** могло. **Решение.** Пусть на доске учитель написал числа  $2^n$ , где  $n$  принимает последовательные 9 целых значений от  $-4$  до  $4$ . Отметим, что произведение всех чисел на доске равно 1. Обозначим множество чисел на доске через  $A = \{a_1, \dots, a_9\}$ , а множество шести учеников через  $Y$ . Обозначим учеников так:  $y_2, y_3, \dots, y_7$  в соответствии с полученным от учителя заданием, так что Аня =  $y_2$ , Боря =  $y_3$ , ..., Егор =  $y_7$ . Количество выписанных чисел (произведений) в наборе ученика  $y_k$  равно  $C_9^k$ . Тем самым, у пары учеников  $y_k$  и  $y_{9-k}$  выписано одинаковое количество чисел (т.к.  $C_9^k = C_9^{9-k}$ ). Покажем, что у этой

пары и сами наборы совпадают. Пусть одно (произвольное) из произведений в наборе ученика  $u_k$  равно  $a_{i_1} \cdot \dots \cdot a_{i_k} = x$ . Обозначим обратные величины  $a_{i_1}^{-1} = a_{j_1}, \dots, a_{i_k}^{-1} = a_{j_k}$ . Они тоже принадлежат множеству  $A$  в силу его определения. Произведение этих обратных величин равно  $x^{-1}$ . Рассмотрим дополнение  $A \setminus \{a_{j_1}, \dots, a_{j_k}\}$ . Оно представляет собой подмножество в  $A$ , состоящее из  $(9 - k)$  чисел. Произведение чисел этого подмножества равно  $(x^{-1})^{-1} = x$  (т.к. произведение всех чисел из  $A$  равно 1). Итак, мы поставили в соответствие любому числу из набора  $u_k$  равное ему число из набора  $u_{9-k}$ . *Комментарий.* 1) Как следует из доказательства, в конструкции примера на доске важно лишь наличие единицы и пар взаимно обратных величин. 2) Покажем, что соответствие, построенное в данном доказательстве, взаимно-однозначное (за отсутствие обоснования взаимной однозначности баллы за задачу предлагаются не снижать). Указанное соответствие можно представить в виде композиции двух отображений на семействе подмножеств (мощности больше 1, но меньше 8) множества  $A$ . Первое из них переводит подмножество  $\{a_{i_1}, \dots, a_{i_k}\}$  в подмножество  $\{a_{j_1}, \dots, a_{j_k}\}$ , составленное из обратных величин, а второе отображение ставит в соответствие подмножеству  $\{a_{j_1}, \dots, a_{j_k}\}$  его дополнение  $A \setminus \{a_{j_1}, \dots, a_{j_k}\}$ . Оба этих отображения являются, очевидно, взаимно-однозначными, что и доказывает взаимную однозначность построенного соответствия.